Observatoire Valaisan de la Santé

COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS ET JEUNES ÂGÉS DE 2, 8 ET 16 ANS EN VALAIS 2025



NOVEMBRE 2026

Impressum

© Observatoire valaisan de la santé, novembre 2026

Reproduction partielle autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Rédaction et analyse des données

Leila Raboud[1], Luc Fornerod[1], Dr. Stefano Tancredi[1,2]

[1]Observatoire valaisan de la santé (OVS), Sion

[2]Laboratoire de santé des populations (#PopHealthLab), Université de Fribourg

Citation proposée

Raboud L, Fornerod L, Tancredi S, Observatoire valaisan de la santé (OVS). Couverture vaccinale des enfants et jeunes âgés de 2, 8 et 16 ans en Valais 2025, novembre 2026

Disponibilité

Observatoire valaisan de la santé : www.ovs.ch
Langue du texte original : Français

Remerciements

Nous remercions la Dre Delphine Berthod, médecin cantonale, et le Dr Cédric Dessimoz, médecin cantonal adjoint, pour leurs suggestions sur une version précédente de ce rapport.

Table des matières

Impressum 2
Table des matières 3
1. Contexte et but de l'étude 4
2. Méthodologie 4
3. Résultats 4
4. Comparaison avec les cibles de couverture vaccinale 11
5. Conclusion 12
5.1. Vaccins recommandés de base 12
5.2. Vaccins recommandés complémentaires 13
5.3. Vaccins recommandés pour les groupes ou situations à risque 13
6. Références 14

1. Contexte et but de l'étude

La vaccination est une mesure de santé publique efficace pour la prévention des maladies infectieuses. Afin d'estimer la couverture vaccinale dans la population et d'adapter les politiques de vaccination en conséquence, il est nécessaire d'avoir des informations sur la vaccination des enfants et des jeunes dans le canton du Valais. La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp RS 818.101) prévoit à l'article 21 que les cantons contrôlent régulièrement « le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire ». Depuis 1999, l'OFSP recense les taux cantonaux de couverture vaccinale pour les vaccinations recommandées de base et complémentaires pour les enfants et jeunes de 2 ans, 8 ans et 16 ans. Ces taux sont établis par l'Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de prévention (EBPI) de l'Université de Zurich, sur la base d'enquêtes réalisées tous les trois ans dans le cadre de la Swiss National Vaccination Coverage Survey. En Valais, l'OVS assure la récolte des données depuis 2022.

2. Méthodologie

- Population cible : Tous les enfants et jeunes âgés de 2 ans, 8 ans et 16 ans vivant dans un ménage privé et faisant partie de la population résidante permanente du canton du Valais.
- Échantillonnage : Échantillon aléatoire simple par catégorie d'âge. 460 personnes pour chaque classe d'âge ont été invitées à participer à l'enquête, soit un total de 1380 personnes pour les trois classes d'âges.
- Récolte des données : Les parents des enfants sélectionnés ont été invités à transmettre une copie ou l'original du carnet de vaccination. La participation était facultative. Les données ont été récoltées entre le 20 février et le 30 septembre 2025.
- Calcul des taux : les taux de couverture vaccinale sont estimés par l'EBPI. Les données sont pondérées par post-stratification selon le sexe, l'âge, la nationalité, le degré d'urbanisation et la région linguistique.
- Les taux de couverture vaccinale 2025 en Valais sont comparés à ceux de 2019 et 2022, ainsi qu'aux taux suisses et aux taux de couverture escomptés définis dans le Plan d'action 2.0 de la Stratégie nationale de vaccination (OFSP/CDS, 2024). Le tableau 1 présente les taux de couverture vaccinale en Valais en 2019, 2022 et 2025, par groupe d'âge, vaccin et nombre de doses.

3. Résultats

Sur les 1380 enfants et jeunes invités à participer à l'étude, 795 carnets de vaccination ont été retournés, soit un taux de participation de 58%. L'échantillon comprend 49% de filles et 51% de garçons. Les figures indiquent les taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion d'enfants et jeunes ayant reçu au moins le nombre de doses recommandé à chaque âge selon le Plan de vaccination suisse 2025. Les taux de couverture vaccinale 2025 sont comparés à ceux de 2019 et 2022, années auxquelles l'étude a été réalisée précédemment en Valais (taux de participation en 2019 : 65 % et en 2022 : 44 %). Pour interpréter l'évolution au fil du temps, il faut de tenir compte des changements de recommandations, dont les effets peuvent apparaitre à des moments différents selon les groupes d'âge étudiés. Par exemple, si une nouvelle recommandation vaccinale destinée aux nourrissons est introduite en 2023, sans rattrapage prévu pour les enfants nés auparavant, ses effets peuvent déjà être visibles chez les enfants de 2 ans en 2025. En revanche, il faudra attendre 2031 et 2039 pour que les enfants nés en 2023 atteignent respectivement l'âge de 8 et de 16 ans, et que les effets de cette recommandation puissent être observés dans ces groupes d'âge. Par

ailleurs, la disponibilité de certains vaccins n'est pas toujours garantie et des périodes de pénurie peuvent survenir. Ces situations peuvent avoir un impact sur les taux de couverture vaccinale, dont l'ampleur ne peut toutefois pas être quantifiée dans le cadre de ce rapport.

VACCINS RECOMMANDÉS DE BASE	TAUX DE COUVERTURE VACCINALE PAR CLASSE D'ÂGE EN 2019, 2022 ET 2025
Diphtérie, tétanos, coqueluche Entre 2019 et 2025, les taux de couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ont légèrement diminué chez les enfants de 2 ans et de 8 ans, et sont restés stables chez les jeunes de 16 ans (**Figures 1, 2 et 3**).	**Figure 1** : Diphtérie  **Figure 2** : Tétanos  **Figure 3** : Coqueluche 

Poliomyélite

Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale contre la poliomyélite a légèrement diminué chez les enfants de 2 ans et de 8 ans, et est resté stable chez les jeunes de 16 ans (**Figure 4**).

Figure 4 : Poliomyélite



Haemophilus influenzae de type b (Hib)

Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale contre le Hib a légèrement diminué chez les enfants de 2 ans et de 8 ans, et est resté relativement stable chez les jeunes de 16 ans (**Figure 5**).

Figure 5 : Haemophilus influenzae de type b (Hib)



Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)

Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole a légèrement diminué chez les enfants de 2 ans et de 8 ans, et a légèrement augmenté chez les jeunes de 16 ans (**Figure 6**).

Figure 6 : Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)



Hépatite B

La vaccination contre l'hépatite B est recommandée chez les nourrissons depuis 2004, mais elle ciblait en priorité les jeunes âgés de 11 à 15 ans jusqu'en 2019. Depuis 2019, il est recommandé de vacciner de préférence les nourrissons. Chez les enfants de 2 et 8 ans, le taux de couverture vaccinale contre l'hépatite B a augmenté entre 2019 et 2025. Chez les jeunes de 16 ans il a légèrement augmenté en 2025 après être resté stable entre 2019 et 2022 (**Figure 7**).

Figure 7 : Hépatite B



Pneumocoques

La vaccination contre les pneumocoques est recommandée chez les nourrissons à titre complémentaire depuis 2005 et comme vaccination de base depuis 2019. Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale contre les pneumocoques a diminué chez les enfants de 2 ans et a légèrement augmenté chez ceux de 8 ans. Chez les jeunes de 16 ans, il a fortement augmenté, particulièrement entre 2022 et 2025 (**Figure 8**).

Figure 8 : Pneumocoques



Papillomavirus humains (HPV)

La vaccination contre les HPV est recommandée comme vaccination de base pour les filles depuis 2007 et pour les garçons depuis 2024, après avoir été recommandée à titre complémentaire pour ces derniers en 2015. Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale chez les filles de 16 ans est resté relativement stable. Chez les garçons, il a fortement augmenté entre 2019 et 2025 pour atteindre un taux proche de celui des filles. (**Figure 9**).

Figure 9 : Papillomavirus humains (HPV)



Varicelle

Depuis janvier 2023, la vaccination contre la varicelle est recommandée comme vaccination de base pour tous les nourrissons, avec deux doses à 9 et 12 mois. Entre 2022 et 2025, la couverture vaccinale a fortement augmenté chez les enfants de 2 ans et légèrement chez ceux de 8 ans. Elle est restée relativement stable chez les jeunes de 16 ans (**Figure 10**).

Figure 10 : Varicelle



VACCINS RECOMMANDÉS COMPLÉMENTAIRES[1]

Méningocoques (C/ACWY)

La vaccination contre les méningocoques C est recommandée à titre complémentaire depuis 2005, avec une dose durant la petite enfance et une autre à l'adolescence. Depuis fin 2018, le vaccin contre les sérogroupes A, C, W et Y est recommandé à la place de celui contre le seul groupe C. Entre 2019 et 2025, le taux de couverture vaccinale contre les méningocoques C/ACWY a légèrement diminué chez les enfants de 2 ans et a légèrement augmenté chez les enfants de 8 ans. Chez les jeunes de 16 ans, il a augmenté sur l'ensemble de la période (**Figure 11**).

Figure 11 : Méningocoques (C/ACWY)



VACCINS RECOMMANDÉS POUR LES GROUPES OU SITUATIONS À RISQUE[2]

Encéphalite à tiques ou méningo-encéphalite verno-estivale (FSME)

Chez les enfants de 8 ans, le taux de couverture vaccinale contre la FSME a fortement augmenté entre 2019 et 2022 puis a légèrement diminué en 2025. Chez les jeunes de 16 ans, il augmente sur l'ensemble de la période (**Figure 12**).

Figure 12 : FSME



[1] Les données de couverture vaccinale publiées par l'OFSP ne couvrent pas les vaccinations contre les méningocoques B et les rotavirus, qui ne sont donc pas présentées dans ce rapport.

[2] Parmi les vaccinations recommandées pour les groupes ou situations à risque, seule la vaccination contre la FSME est présentée, en raison de sa pertinence pour le Valais, situé en zone à risque.

Tableau 1 : Taux de couverture vaccinale (%) des enfants et jeunes de 2, 8 et 16 ans en Valais, en 2019, 2022 et 2025

Vaccination	Doses de vaccin	2 ans			8 ans			16 ans		
		2019	2022	2025	2019	2022	2025	2019	2022	2025
		n=260	n=301	n=260	n=270	n=344	n=284	n=247	n=272	n=251
Diphtérie	3	97	97	94	98	98	97	95	95	95
	4	90	5	4	98	96	94	94	93	93
	5	-	-	–	88	86	75	92	91	90
	6	-	-	–	–	–	–	78	77	73
Tétanos	3	97	97	94	98	98	97	96	96	95
	4	90	5	4	98	96	94	95	93	94
	5	-	-	–	88	85	75	92	91	91
	6	-	-	–	–	–	–	79	77	73
Coqueluche	3	96	96	94	98	96	96	94	92	93
	4	90	5	4	97	94	94	93	91	92
	5	-	-	–	87	85	75	90	90	89
	6	-	-	–	–	–	–	74	74	69
Poliomyélite	3	97	96	94	98	98	97	96	93	95
	4	90	5	4	98	96	94	94	92	94
	5	-	-	–	86	82	74	87	85	85
	6	-	-	–	–	–	–	13	24	29
Hib	3	96	94	93	97	94	94	90	89	92
	4	90	5	3	95	87	85	84	81	88
Hépatite B	1	80	85	95	63	69	84	85	86	91
	2	77	85	94	62	66	82	83	83	87
	3	75	83	92	60	63	80	36	38	61
	4	56	4	3	45	38	62	5	12	41
Pneumocoques	1	95	95	95	89	89	91	5	37	86
	2	95	95	93	86	86	90	3	27	85
	3	93	89	85	80	82	84	3	17	78
Rougeole	1	97	95	95	98	98	95	97	95	97
	2	94	94	91	97	96	93	93	92	96
Oreillons	1	97	95	95	98	98	95	96	95	97
	2	94	94	91	97	96	93	93	92	96
Rubéole	1	97	95	95	98	98	95	96	95	97
	2	94	94	91	97	96	93	93	92	96
Varicelle	1	-	11	67	–	9	15	8	13	13
	2	-	10	63	–	8	12	5	12	11
HPV - filles	1	-	-	–	–	–	–	75	73	74
	2	-	-	–	–	–	–	73	70	71
	3	-	-	–	–	–	–	1	1	1
HPV - garçons	1	-	-	–	–	–	–	14	68	72
	2	-	-	–	–	–	–	13	67	70
	3	-	-	–	–	–	–	3	1	2
Méningocoques	1	94	90	91	87	85	90	65	73	85
	2	-	-	–	–	–	–	36	42	54
FSME	1	-	-	–	36	60	58	23	46	56
	2	-	-	–	32	59	55	22	45	54
	3	-	-	–	24	52	49	17	39	49

– : données non disponibles ou non recueillies.

Source : OFSP. Couverture vaccinale des enfants âgés de 2, 8 et 16 ans en Suisse, 1999–2025. Données du canton du Valais pour les années 2019, 2022 et 2025.

4. Comparaison avec les cibles de couverture vaccinale

Le tableau suivant présente les taux de couverture vaccinale en Valais en 2025 et en Suisse pour la période 2023–2025, années des dernières enquêtes réalisées dans les différents cantons, pour les vaccinations et les groupes d'âge associés à une cible figurant dans le Plan d'action 2.0 de la Stratégie nationale de vaccination (OFSP/CDS, 2024). Les taux valaisans sont mis en perspective avec ces cibles.

Tableau 1 : Taux de couverture vaccinale (TV) en Valais, en Suisse et cibles

Groupe d'âge	Vaccination	Nombre de doses	TV Suisse 2023-2025	TV Valais 2025	TV cible	Écart TV Valais 2025 et TV cible
2 ans	Hib	3	95%	93%	95%	-2
	ROR	2	92%	91%	95%	-4
	Coqueluche	3	95%	94%	95%	-1
8 ans	Poliomyélite	4	94%	94%	95%	-1
16 ans	Diphtérie	5	91%	90%	95%	-5
	Tétanos	5	92%	91%	95%	-4
	Hépatite B	2	81%	87%	80%	+7
	HPV filles	2	71%	71%	80%	-9
	HPV garçons	2	58%	70%	80%	-10

Pour ces vaccinations, les taux de couverture vaccinale en Valais sont comparables ou supérieurs aux taux suisses. Pour la vaccination contre les HPV, il subsiste, en Valais comme en Suisse, un écart significatif entre le taux constaté et la cible à atteindre.

5. Conclusion

5.1. Vaccins recommandés de base

Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, haemophilus influenzae de type b (Hib)
En Valais, les taux de couverture vaccinale contre ces maladies sont élevés en 2025 mais restent toutefois légèrement inférieurs aux cibles de 95% définies dans le Plan d'action 2.0 de la Stratégie nationale de vaccination (OFSP/CDS, 2024) : ils atteignent 93% pour le Hib et 94% pour la coqueluche à 2 ans, 94% pour la poliomyélite à 8 ans ainsi que 90% pour la diphtérie et 91% pour le tétanos à 16 ans. Les taux valaisans sont proches des taux suisses.

Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)
En 2025, les taux de couverture vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sont élevés en Valais : ils atteignent 91% à 2 ans, 93% à 8 ans et 96% à 16 ans. À 2 ans, le taux valaisan est proche du taux suisse de 92%, mais inférieur à la cible de 95% définie dans le Plan d'action 2.0 de la Stratégie nationale de vaccination.

Hépatite B
Depuis 2019, la vaccination contre l'hépatite B est recommandée de préférence chez les nourrissons et également entre 11 et 15 ans pour les jeunes non encore vaccinés. En 2025, la couverture vaccinale en Valais atteint 92% à 2 ans, 80% à 8 ans et 87% à 16 ans. Chez les jeunes de 16 ans, le taux valaisan dépasse la cible de 80% retenue dans le Plan d'action 2.0 et est supérieur au taux suisse de 81%.

Pneumocoques
La vaccination contre les pneumocoques fait partie des vaccinations recommandées de base depuis 2019. Selon le Plan de vaccination suisse 2025, une couverture vaccinale de 80% chez les enfants de moins de 2 ans permet une protection indirecte contre les maladies invasives à pneumocoques dans les autres groupes d'âge. En 2025, la couverture vaccinale à 2 ans atteint 85% en Valais, un niveau supérieur à ce repère, mais inférieur au taux suisse de 90%. Le Plan d'action 2.0 ne définit pas de cible pour cette vaccination.

Papillomavirus humains chez les filles et les garçons
La vaccination contre les HPV est recommandée comme vaccination de base pour les filles depuis 2007 et pour les garçons depuis 2024, après avoir été recommandée à titre complémentaire pour ces derniers depuis 2015. En 2025, les taux de couverture vaccinale chez les jeunes de 16 ans sont de 71% chez les filles et de 70% chez les garçons. Ils sont inférieurs à la cible de 80% du Plan d'action 2.0. Le taux valaisan est identique au taux suisse chez les filles et supérieur chez les garçons, pour lesquels le taux suisse est de 58%.

Varicelle
Depuis janvier 2023, la vaccination contre la varicelle est recommandée comme vaccination de base pour tous les nourrissons, avec deux doses à 9 et 12 mois. En 2025, la couverture vaccinale à 2 ans atteint 63% en Valais, contre 53% en Suisse. Chez les enfants de 8 ans et les jeunes de 16 ans, la couverture vaccinale reste faible. Chez ces générations, une faible couverture vaccinale ne signifie toutefois pas nécessairement une faible protection contre la varicelle, car une infection antérieure

confère généralement une immunité. Le rattrapage concerne les personnes n'ayant pas eu la varicelle et n'ayant pas reçu deux doses de vaccin.

5.2. Vaccins recommandés complémentaires

Méningocoques C/ACWY
La vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée à titre complémentaire afin d'assurer une protection individuelle optimale contre les maladies invasives dues à ces sérogroupes. Elle est recommandée chez les jeunes enfants à 12–18 mois et chez les jeunes à 11–15 ans. En 2025, la couverture vaccinale pour une dose atteint 91% à 2 ans et 90% à 8 ans en Valais, contre respectivement 83% et 80% en Suisse. Chez les jeunes de 16 ans, elle atteint 54 % pour deux doses, contre 44% en Suisse. Le Plan d'action 2.0 ne définit pas de cible pour cette vaccination.

5.3. Vaccins recommandés pour les groupes ou situations à risque

Encéphalite à tiques ou méningo-encéphalite verno-estivale (FSME)
La vaccination contre la FSME est recommandée aux personnes exposées aux tiques dans les zones à risque, dont le Valais fait partie. Depuis 2024, elle est généralement recommandée dès l'âge de 3 ans, contre 6 ans auparavant. En 2025, la couverture vaccinale en Valais atteint 49% chez les enfants de 8 ans comme chez les jeunes de 16 ans. Ces taux sont inférieurs aux taux suisses, qui atteignent respectivement 55% et 56%. Le Plan d'action 2.0 ne définit pas de cible pour cette vaccination.

6. Références

Office fédéral de la santé publique, Commission fédérale pour les vaccinations. Plan de vaccination suisse 2025. Directives et recommandations. Berne : Office fédéral de la santé publique, 2025.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Plan d'action 2.0 de la Stratégie nationale de vaccination. Berne : OFSP ; 2024.

Office fédéral de la santé publique (OFSP). Couverture vaccinale des enfants âgés de 2, 8 et 16 ans en Suisse, 1999–2025. Tableau de données Excel, publié le 15 septembre 2026.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Adaptation des recommandations pour la prévention de l'hépatite B. Bulletin OFSP 2019 ; 13 : 24–27.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). La vaccination contre les pneumocoques pour les enfants de moins de 5 ans est désormais recommandée comme vaccination de base. Bulletin OFSP 2019 ; 13 : 32–34.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Vaccination de base contre les HPV pour les garçons. Bulletin OFSP 2024 ; 3 : 22–29.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Nouvelles recommandations relatives à la vaccination contre la varicelle. Bulletin OFSP 2022 ; 44 : 10–16.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Recommandations de vaccination complémentaire contre les maladies invasives à méningocoques. Bulletin OFSP 2024 ; 3 : 8–21.

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Recommandations de vaccination contre la méningo-encéphalite à tiques (FSME) – Mise à jour. Bulletin OFSP 2024 ; 33 : 8–9.

Office fédéral de la santé publique (OFSP). Couverture vaccinale des enfants âgés de 2, 8 et 16 ans en Suisse, 2020–2022. Bulletin OFSP 2024 ; 13 : 8–14.



Observatoire Valaisan de la Santé

Avenue Grand-Champsec 64
1950 Sion

www.ovs.ch